



Esquema de vacunación recomendado para adultos después de un trasplante de médula ósea

Tiempo después del trasplante

	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	12 meses	14 meses	18 meses	19 meses	24 meses
Influenza	1 dosis									
COVID	1 dosis	1 dosis		1 dosis						
VSR	1 dosis (a los 60 años)									
Neumococo PCV20	1 dosis		1 dosis		1 dosis					
Hexavalente	1 dosis	1 dosis	1 dosis				1 dosis			
Hepatitis A	1 dosis	1 dosis								
Hepatitis B	1 dosis	1 dosis				1 dosis				
Herpes zóster		1 dosis	1 dosis							
Meningococo ACYW			1 dosis					1 dosis		
VPH						1 dosis	1 dosis	1 dosis		
Triple viral*										2 dosis (0 y 1 mes)
Varicela**										2 dosis (0 y 1 mes)

Influenza: se puede empezar a los 3 meses, si coincide con la temporada; revacunación anual con 1 dosis antes del inicio de la temporada de influenza

COVID-19: se puede empezar a los 3 meses, según el comportamiento epidemiológico del virus; revacunación anual con 1 dosis de vacuna actualizada

*Sólo si se cumplen TODOS los siguientes: a) sin enfermedad de injerto contra huésped, b) sin inmunosupresión sistémica por >12 meses y c) sin inmunoglobulina IV por al menos 3 meses

**Sólo si se cumplen TODOS los siguientes: a) sin enfermedad de injerto contra huésped, b) sin inmunosupresión sistémica por >12 meses, c) sin inmunoglobulina IV por al menos 3 meses y d) serología para VZV negativa